

猴头菌颗粒联合潘托拉唑治疗 消化性溃疡 150 例临床观察

刘少俊, 唐五良

(中南大学湘雅三医院消化科, 湖南长沙 410013)

为探讨消化性溃疡更为有效的治疗方案,我们在 2005 年 8 月至 2006 年 7 月,采用猴头菌颗粒、潘托拉唑用药为治疗组和单用潘托拉唑为对照组共治疗 300 例消化性溃疡(PU)患者,以研究猴头菌颗粒对 PU 治疗的应用价值。

1 资料和方法

1.1 病例选择

所选病例均系门诊患者,经均电子胃镜检查证实为 PU 患者(溃疡个数 ≤ 2 个,直径 $\leq 2.0\text{cm}$)。治疗前 4 周未用过质子泵抑制剂、 H_2 受体拮抗剂、铋剂、非甾体类消炎镇痛药;无胃肠道手术史;无严重心、肺、肝、肾等疾病史;不伴消化道出血或幽门梗阻等并发症。考虑恶性病变者除外。

1.2 临床资料

按就诊顺序满 300 例为止,并随机分为治疗组和对照组。治疗组 150 例,男 86 例、女 64 例,年龄 16~70 岁,平均 33 岁,病程 2 个月~20 年,平均 8.5 年;胃溃疡(GU) 55 例,十二指肠溃疡(DU) 95 例。对照组 150 例,男 82 例、女 68 例,年龄 17~69 岁,平均年龄 35.5 岁,病程 6 个月~14 年,平均 5.8 年;GU 48 例,DU 102 例。两组均无其它原发疾病,在年龄、性别及病症方面无显著差异,具有可比性($P \leq 0.05$)。

1.3 治疗用药

猴头菌颗粒(商品名:谓葆,规格:每包 3g,无糖型,山西康欣药业有限公司),3g,口服,每日 3 次。潘托拉唑(商品名:健朗晨,

规格:40mg,湖南岳阳制药厂),40mg 口服,每日 1 次。**治疗组**:服用谓葆猴头菌颗粒,每次 3g,每日 3 次;健朗晨,每次 40mg,每日 1 次,4 周为 1 疗程,1 疗程后复查胃镜。**对照组**:服用健朗晨,每次 40mg,每日 1 次,4 周为 1 疗程,1 疗程后复查胃镜。

1.4 疗效标准

治愈:症状体征消失,胃镜复查提示溃疡面愈合或至瘢痕期;**好转**:症状体征明显减轻,胃镜检查溃疡面愈合 1/2 以上;**无效**:临床症状无改善,胃镜下溃疡面无改善或增大。

2 结果

2.1 临床疗效比较

300 例患者均按疗程服完药物并复查胃镜,治疗组 150 例,治愈 133 例(89%),好转 15 例(10%),无效 2 例(2%),总有效率 99%;对照组 150 例,治愈 116 例(77%),好转 21 例(14%),无效 13 例(9%),总有效率 91%。两组治愈率、总有效率比较差异有显著性意义($P < 0.05$),治疗组优于对照组。

2.2 症状改善时间比较

治疗组 150 例:上腹痛 140 例,缓解时间 $3 \pm 2\text{d}$;腹胀 120 例,缓解时间 $5 \pm 2\text{d}$ 。对照组 150 例:上腹痛 145 例,缓解时间 $5 \pm 2\text{d}$;腹胀 126 例,缓解时间 $8 \pm 3\text{d}$ 。统计学处理差异有显著性意义($P < 0.05$),治疗组优于对照组。

3 讨论

消化性溃疡是消化系统疾病中常见、多发病之一,且呈慢性、反复发作。现代医学证明,

溃疡的发病原因是由于对胃十（下转第94页）

