

复方天麻蜜环糖肽片治疗椎基底动脉供血不足效果观察

梁军

(广东省深圳市福田区中医院特发社康中心, 广东深圳 518034)

头晕头痛为临床中常见症状, 相当多是由椎基底动脉供血不足引起, 我社康中心应用山西康欣药业有限公司生产的治疗脑血管及神经系统疾病的新药复方天麻蜜环糖肽片, 治疗椎基底供血不足 100 例, 疗效显著, 报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

200 例患者均为随机选取的门诊患者, 平均年龄 48 岁, 其中男 106 例, 女 94 例。随机分为治疗和对照组各 100 例。临床表现为头晕, 视物旋转, 恶心, 呕吐等, 经颅彩色多普勒检查显示椎基底动脉痉挛, 脑供血不足, 头颅 CT 排除颅内其他器质性疾病, 且无肝、肾、心、肺严重并发症。

1.2 方法

所有患者均分别给病因治疗, 包括去除诱因、休息、血管扩张药剂、脱水药剂、镇静药剂、维生素 B1 和维生素 B12 等去对症治疗。症状改善不明显者, 治疗组口服复方天麻蜜环糖肽片 (商品名: 璠珍, 山西康欣药业有限公司生产, 批准文号: 国药准字 H14022944), 每次 1.0 g, 每日 3 次, 对照组口服复方丹参片, 每次 4 片, 每日 3 次。2 组均用药 10 周。观察临床症状和体征。

1.3 疗效判定标准

显效: 症状消失或基本消失; 有效: 症状减轻或好转; 无效: 症状无明显改善。

1.4 统计学分析

计数资料比较采用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

治疗组有效率为 96.0%, 对照组为 82.0%, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 见表 1。

表 1 2 组临床疗效比较 n=100, 例 (%)

组别	显效	有效	无效	有效率 (%)
治疗组	68 (68.0)	28 (28.0)	4 (4.0)	96.0*
对照组	50 (50.0)	32 (32.0)	18 (18.0)	82.0

注: 与对照组比较, * $P < 0.05$

3 讨论

椎基底动脉供血不足的病因、发病机制和病理生理是多种因素综合作用的结果, 血黏度高 (高血脂、血小板增多症), 动脉硬化, 颈椎增生, 心脏供血不足等均可引起。通过本组用化学药复方天麻蜜环糖肽片的治疗总有效率明显优于一般中成药复方丹参。其原因: (1) 复方天麻蜜环糖肽片是真菌发酵提取的生化药品, 它的组分为天麻蜜环菌提取物及黄芪、当归提取物, 其生物真菌多糖多肽含量高, 稳定; (2) 复方制剂优于单方, 复方天麻蜜环糖肽片中的 3 种成分配伍优于单一成分的中成药。

复方天麻蜜环糖肽片疗效确切, 治愈率高, 其药理作用如下: (1) 天麻蜜环菌和中枢抑制药戊巴比妥钠有协同作用, 对中枢兴奋药五甲烯四氮唑有拮抗作用, 同时能降低脑冠状动脉及外周血管阻力, 增加血流量, (下转第 28 页)

